

(DPT-IPV)

4種混合

(DPT)

3種混合

(DT)

2種混合

日本脳炎ワクチン
を受けたあとの注意



1

接種当日は接種部位を清潔に保ち、いつも通りの生活をしましょう。また、はげしい運動は避けてください。

2

接種を受けた日に入浴しても差し支えありませんが、注射した部位をこするのはやめましょう。

3

接種を受けた直後、または数時間経ってからアレルギー症状(発しん・じんましんなど)が出た場合は速やかに医者さんの診察を受けてください。

4

接種部位が腫れたり痛んだりすることがありますが、いずれも一過性で通常2~3日で治ります。腕全体が腫れるなど異常な症状が現れたときは速やかに医者さんの診察を受けてください。

5

接種を受けたあと、高熱やけいれんなど、体調の変化が現れたときは、速やかにお医者さんの診察を受けてください。

6

近日中に予防接種を受ける場合は、出来るだけ今回と反対側の腕に受けるようにしましょう。また、特にお医者さんが必要と認めた場合以外、接種間隔は6日以上あけましょう。

7

次回の接種を忘れないようにしましょう。

今回受けたワクチン

()ワクチン()期()回

次回の接種予定

無・有()年()月()日ごろ来院)

医師記入欄

医院名

 田辺三菱製薬

5BI-304B-
2013年1月作成